

İmal Tarihi:

Son Kullanma Tarihi:

Şarj No:

Ruhsat Tarih ve No.su: 22.04.2010 /7680

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Bağ *	Köpekdişi ayrıgi Kanyaş (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Köpekdişi ayrıgi 15-20 cm, kanyaş 2-3 kardeşte iken
Domates	Köpekdişi ayrıgi Darçan Kanyaş (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Domatesler 15-20 cm boyda, yabancı otlar 3-6 yapraklı dönemde, Çıkış sonrası
Ayçiçeği	Tilkikuyruğu Brom Köpekdişi ayrıgi Darçan Yabani arpa Yabani dari Çayır püskülü Yapışkan dari Kanyaş (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Bromus spp.</i>) (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Hordeum spontaneum</i>) (<i>Panicum spp.</i>) (<i>Poa spp.</i>) (<i>Setaria spp.</i>) (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4 yapraklı olduğu dönemde, Çıkış sonrası
Soğan	Darçan Yapışkan dari Kanyaş (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Setaria spp.</i>) (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Soğan 15-20 cm boyunda, kanyaş 3-5 yapraklı, darçan ve yapışkan dari 10-15 cm boyunda iken
Kırmızı mercimek	Tilkikuyruğu Kısır yabani yulaf Kendi gelen arpa Kendi gelen buğday (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena sterilis</i>) (<i>Hordeum vulgare</i>) (<i>Triticum aestivum</i>)	75 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde Çıkış sonrası
	Ayrık (<i>Elymus repens</i>)	100 ml/da Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde Çıkış sonrası
Şekerpancarı	Tilkikuyruğu Yabani yulaf Püsküllü çayır Darçan, (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena fatua</i>) (<i>Bromus tectorum</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	75-100 ml/da Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır.
Pamuk	Kanyaş (<i>Sorghum halepense</i>)	75-100 ml/da Tohumdan gelenlerde düşük, rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır.
Soya fasulyesi	Tilkikuyruğu Köpekdişi ayrıgi Darçan Kuşyemi Yabani dari Kanyaş (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Phalaris spp.</i>) (<i>Panicum spp.</i>) (<i>Sorghum halepense</i>)	100 ml/da Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede Çıkış sonrası
Kanola	Delice (<i>Lolium temulentum</i>)	200 ml/da Çıkış sonrası
	Tilkikuyruğu Kısır yabani yulaf Köpekdişi ayrıgi Kuşyemi Çayır püsküllü Yapışkan dari Kendi gelen buğday (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena sterilis</i>) (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Phalaris spp.</i>) (<i>Poa spp.</i>) (<i>Setaria spp.</i>) (<i>Triticum aestivum</i>)	100 ml/da Çıkış sonrası
Nohut	Tilkikuyruğu Yabani yulaf Kendi gelen buğday (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Avena fatua</i>) (<i>Triticum aestivum</i>)	75 ml/da Çıkış sonrası

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

GIDA TARIM VE HAYVANCIKLIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

25 Mayıs 2018

FNC Tarım

**FNC TARIM TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

ABONE® SÜPER 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A,1	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

50 g/l Quizalofop-p-ethyl

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMİR İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞINDA KULLANILMASI KEŞİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulanık görme görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Cilt: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlk kez degen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurun.

Yutma: Doktor tarafından aksı söylenmekle kustumaya çalışmayın. Zehir dâhiye merkezini arayın veya doktora başvurun. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kustumaya çalışmayın.


Soluma: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunum yavaşlamışsa suni solunum yapın. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTO VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidoto yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

® FNC TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN TESCİLLİ
MARKASIDIR.



Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

Net Miktarı:

Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER:

Quizalofop-p-ethyl
Aromatik hidrokarbon

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H226 Alevlenir sıvı ve buhar
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tâhrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P):

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P261 Tozunu/dumanının/gazının/sisini/buharını/spreyi solumaktan kaçının.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arıları zehirlidir. Çeşkelenme zamanı uygulamayınız.
- Balıklar İçin zehirlidir, yeraltı ve yeraltı sulanına bulastırmaktan kaçınınız.
- Depoda başka ürünlerle karışmasına mani olunuz.
- Bitki koruma ürününün hazırlanmasında temiz su kullanınız.
- Tohumlarla temas ettirmeyiniz.
- Buğdaygilere karşı fitotoksiktir.
- Bitki koruma ürünü serin, kuru ve iyi havalandırma olan yerlerde muhafaza ediniz.
- Ürünü kendi ambalajında ağız kapalı olarak saklayıniz.
- Bos ürün ambalajlarını başka gaye için kullanmayın, usulüne göre imha ediniz.

RUHSAT SAHİBİ FİRMÀ:

FNC TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad. No:3

Bor/Niğde

Tel: (0 388) 315 00 79

Fax: (0 388) 315 00 89

ÜRETİCİ FİRMÀ:

FNC TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi

Ankara Asfaltı 9.Km. 2 B Nolu Yol No:7 Bor/Niğde

Tel: (0 388) 315 00 79

Fax: (0 388) 315 00 89



BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yanya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günde serin saatlerinde, rüzgarlı veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıtırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayın. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayın.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanya için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları dönemdir.) yabancı otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişimlerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ABONE® SÜPER 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A,1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ABONE® SÜPER 5 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayıza. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A,1 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.



FNC TARIM TİCARET VE
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ABONE® SÜPER 5 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	A,1	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

50 g/l Quizalofop-p-ethyl

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ FIRMA:

FNC TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.
No:3 Bor/Niğde
Tel: (0 388) 315 00 79
Fax:(0 388) 315 00 89

ÜRETİCİ FIRMA:

FNC TARIM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Niğde Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi
Ankara Asfaltı 9.Km. 2 B Nolu Yol No:7 Bor/Niğde
Tel: (0 388) 315 00 79
Fax:(0 388) 315 00 89

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
25 Mayıs 2018



Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V

